

ગાઉટ

ગાઉટ નો દુઃખાવો મટાડવા માટે કઈ દવાઓ વપરાય છે?

- NSAIDS પ્રકાર ની દવાઓ જેવી કે ડાઇક્લોફેનાક, નેપ્રોક્સેન, ઇન્ડોમેથાસિન, ઇટોરીકોક્સીબ - ગાઉટ ના અસહ્ય દુઃખાવા વખતે વાપરવામાં આવે છે.
- જે દર્દીઓની કીડની ખરાબ હોય છે તેમને સાંધામાં સ્ટીરોઇડ ઇન્જેક્શન અથવા ૫-૧૦ દિવસ નો સ્ટીરોઇડ ગોળીનો કોર્સ આપી શકાય છે.
- ગાઉટ ના દુઃખાવાનો "એટેક" આવતો રોકવા માટે કોલચીસીન નામની દવા આપવામાં આવે છે

ગાઉટ કોને થઈ શકે છે?

- ગાઉટ સામાન્ય રીતે પુરૂષોમાં જ ૩૦ વર્ષની ઉંમર પછી થાય છે. સ્ત્રીઓમાં ગાઉટ ભાગ્યે જ થાય છે. સ્ત્રીઓમાં ગાઉટ મેનોપોઝ પછીજ થાય છે.

ગાઉટ શું કામ થાય છે?

- દર્દી ના શરીરમાં યુરીક એસીડની માત્રા સામાન્ય રીતે ૬.૫ mg/dl થી વધે છે ત્યારે આ યુરીક એસીડના કણ સાંધામાં જમા થાય છે. સાંધામાં યુરીક એસીડ જમા થવાથી ગાઉટ નો "એટેક" આવે છે.

શરીરમાં યુરીક એસીડની માત્રા શું કામ વધે છે?

- દરેક નોર્મલ માણસના શરીરમાં યુરીક એસીડ બને છે. દર્દી ના શરીરના બંધારણમાં ખામી હોવાના કારણે યુરીક એસીડ વધારે બને છે અથવા કીડનીમાંથી તેની નિકાસ ઘટે છે. મોટા ભાગના દર્દી મા કીડનીમાંથી યુરીક એસીડની નિકાસ ઓછી થવાના કારણે યુરીક એસીડ વધે છે.

ગાઉટ નું નિદાન કઈ રીતે થાય છે?

- ગાઉટનું સચોટ નિદાન સાંધાના પ્રવાહીમાં યુરીક એસીડ દેખાય ત્યારે જ થાય છે. જ્યારે સાંધામાંથી પ્રવાહી ખેંચવું શક્ય નથી ત્યારે લાક્ષણિક ચિન્હો પર થી ગાઉટનું નિદાન કરી શકાય છે.
- લોહીની તપાસમાં યુરીક એસીડની માત્રા વધારે હોવા છતાં લાક્ષણિક ચિન્હો ન ધરાવતા દર્દીમાં ગાઉટનું નિદાન કરી શકાતું નથી.

ગાઉટનું નિદાન થયા પછી કઈ તપાસ કરવામાં આવે છે?

- ગાઉટનું નિદાન થયા લોહીમાં યુરીક એસીડની માત્રા, ૨૪ કલાકમાં પેશાબમાં જતી યુરીક એસીડની માત્રા તપાસવામાં આવે છે. લોહીના કણો, કીડની, લિવરની તપાસ દવા શરૂ કરતા પહેલા કરવામાં આવે છે. ડાયાબીટીસ / કોલેસ્ટેરોલ/ બીપી ની તપાસ દરેક દર્દી માં કરવી જરૂરી છે.

ગાઉટ ની સારવાર કઈ રીતે કરવામાં આવે છે?

ગાઉટ ની સારવાર બે તબક્કે થાય છે.

- સાંધામાં થતો અસહ્ય દુઃખાવો મટાડવો.
- સાંધાનો દુઃખાવો ફરીથી ન થાય તે રીતે બિમારી કાબુમાં રાખવી.

ગાઉટનો દુઃખાવો ફરી ન થાય અને બિમારી કાબુમાં રહે તે માટે કઈ દવાઓ વાપરવામાં આવે છે?

- બિમારીને કાબુમાં રાખવા માટે યુરીક એસીડ ૬.૫ mg/dl થી નીચે રાખવું જરૂરી છે.
- Urate lowering drugs - એલોપ્યુરીનોલ, ફેબ્યુક્સોસ્ટેટ આ પ્રકાર ની દવાઓ છે. આ દવાઓ

ગાઉટનો દુખાવો કાબૂમાં આવ્યા પછી ચાલુ કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે એલોપ્યુરીનોલ પહેલા વાપરવામાં આવે છે. જે દર્દીઓની કીડની ખરાબ હોય છે તેમાં ફેબ્યુક્સોસ્ટેટ પહેલા વાપરી શકાય છે. બન્ને દવા એકસરખી અસરકારક છે.

શું દરેક દર્દીઓને Urate lowering drugs - એલોપ્યુરીનોલ, ફેબ્યુક્સોસ્ટેટ પ્રકાર ની દવાઓ જરૂરી છે?

- ના. ગાઉટના ઘણા દર્દીઓ પરેજી રાખી કોલચીસીન દવાથી વર્ષો સુધી દુઃખાવા વિના રહી શકે છે.

ગાઉટ ની દવા ક્યા સુધી લેવી જોઈએ?

- ગાઉટની દવા આજીવન ચાલુ રાખવી પડે છે.

ગાઉટના દર્દીઓએ ખોરાકમાં શુ પરેજી પાળવી જરૂરી છે?

- શાકાહારી દર્દીઓએ ખોરાકમાં કોઈ પરેજી પાળવી જરૂરી નથી. શાકાહારી દર્દીઓએ નિયત માત્રામાં કલેબ પણ ખાઈ શકે છે. નોન વેજીટેરીયન દર્દીઓ નાની માત્રામાં ફીશ, ચીકન ખાઈ શકે છે.
- દરેક દર્દીએ તળેલો, ફેટ ધરાવતો ખોરાક ટાળવો જોઈએ.
- દારૂ નુ સેવન ગાઉટ માટે હાનિકારક છે.

