

સ્કલેરોડમાઈ

❖ સ્કલેરોડમાઈમાં શું તપાસ કરવામાં આવે છે?

- બિમારીની શરૂઆતમાં લોહીના કણો, લીવર, કીડની, હૃદય, ફેફસાની તપાસ દર્દીના ચિન્હો પ્રમાણે જરૂર મુજબ કરવામાં આવે છે.

❖ સ્કલેરોડમાઈ ના પેટા પ્રકાર કેટલા હોય છે?

સ્કલેરોડમાઈના આ બે મુખ્ય પેટા પ્રકાર છે

1. લીમીટેડ સ્કલેરોડમાઈ
2. જનરલાઇઝડ સ્કલેરોડમાઈ

- મોર્ફીઆ, લીનીયર સ્કલેરોડમાઈ વગેરે બીજા પ્રકાર છે જે ચામડીના નાના ભાગને જ અસર કરે છે.

❖ સ્કલેરોડમાઈમાં ક્યા અંગો પર અસર થાય છે?

- ચામડી, આંતરડા, ફેફસાં, લોહીની નસો, સાંધા, હૃદય ઉપર આ બિમારીની અસર થાય છે.

❖ સ્કલેરોડમાઈના ચિન્હો શું હોય છે?

- સ્કલેરોડમાઈના મોટા ભાગના દર્દીમાં શરૂઆતમાં આંગળીની ચામડીમાં સોજો આવે છે. જનરલાઇઝડ સ્કલેરોડમાઈમાં ધીમે ધીમે આખા શરીરની ચામડી પર સોજો આવે છે.
- શિયાળામાં આંગળીઓમાં લોહીના ભ્રમણમાં તકલીફ થાય છે. આંગળીનો રંગ ઠંડા તાપમાન સાથે સફેદ, ભૂરો, લાલ થાય છે. આંગળી ના ટેરવા ઉપર ચાંદી પડે છે.
- ફેફસા ઉપર અસર ધરાવતા દર્દીને સૂકી ખાંસી આવે છે, થોડા શ્રમ સાથે શ્વાસ ચડે છે.
- આંતરડા ઉપર અસર થવા સાથે એસીડીટી/ ગેસ થાય છે. પિત્ત થાય છે. સાંધા તથા શરીર દુ:ખે છે.
- હૃદય : ઉપર અસર થતા તેના અમુક પ્રકારના પ્રેશરમાં વધારો થાય છે.

❖ સ્કલેરોડમાઈનું નીદાન કઈ રીતે થાય છે?

- સ્કલેરોડમાઈનું નીદાન બિમારીના લાક્ષણિક ચિન્હો ઉપરથી થાય છે. બિમારીની શરૂઆતમાં ફક્ત ચામડી ઉપર અસર હોય ત્યારે ચામડીની બાયોપ્સી, ANA (IF), ENA profile નીદાન કરવામાં મદદ કરે છે.

❖ સ્કલેરોડમાઈ ની સારવાર કઈ રીતે કરવામાં આવે છે?

- લોહીનું ભ્રમણ સુધારવા માટે વાઝોડાઇલેટર (vasodilator) પ્રકારની દવાઓ જેમકે નેફીડીપીન, એમ્લોડીપીન, સિલ્ડેનાફીલ, ટેડાલાફીલ વાપરવામાં આવે છે.
- અન્નળી ઉપર અસર ધરાવતા દર્દીઓને ઓમીપ્રાઝોલ, પેન્ટોપ્રાઝોલ, રાબેપ્રાઝોલ વગેરે એસીડીટી ઓછી કરવા માટે આપવામાં આવે છે.
- આંતરડાને લયબદ્ધ કરવા ડોમપેરીડોન, મોસાપ્રાઇડ, ઇટોપ્રાઇડ, લેવીપ્રાઇડ વાપરી શકાય છે.
- ફેફસા ઉપર અસર ધરાવતા દર્દી જેમની બિમારી ઝડપથી આગળ વધે છે - તેમા સ્ટીરોઇડ, સાયક્લોફોસ્ફોમાઇડ, એઝથાયોપ્રીન વગેરે વાપરવામાં આવે છે.
- હૃદયમાથી ફેફસામા પહોંચતી ધમનીનું પ્રેશર વધારે હોય ત્યારે - સિલ્ડેનાફીલ, ટેડાલાફીલ, પ્રોસ્ટાસાયક્લીન, બોસેન્ટાન વગેરે દવાઓ જરૂર પ્રમાણે વાપરી શકાય છે.
- ચામડી ઉપરની અસર રોકવા માટે જરૂરીયાત મુજબ દવા ડોક્ટર દ્વારા અપાય છે.

- ❖ સ્કલેરોડમૉ ધરાવતા દર્દીઓએ જીવન જીવવાની પધ્ધતીમાં શું ફેરફાર કરવો જોઈએ?
 - ખોરાકને અને આ બિમારીને સીધો સબંધ નથી. ખટાશ ખાઈ શકાય છે.
 - આંતરડા ઉપર અસર ધરાવતા દર્દીઓએ તીખું, તળેલું ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. સાંજે સૂવાના બે-ત્રણ કલાક પહેલાં જમી લેવું જોઈએ. રાતે જમવામા પ્રવાહી ઓછું લેવું જોઈએ.
 - લોહીના ભ્રમણમાં અસર ધરાવતા દર્દીઓએ ઠંડા પાણીમાં હાથ નાખવાનું ટાળવું જોઈએ. શિયાળામાં ઉંનના મોજાં પહેરવા જોઈએ.
 - ફેફસા તથા હૃદય ઉપર અસર ધરાવતા દર્દીઓએ અતિશય શારીરિક શ્રમ ન કરવો જોઈએ.

